

**POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZYJMOWANIA DOUSTNYCH LEKÓW
PRZECIWKRZEPLIWYCH**

Nazwa międzynarodowa leku	Nazwa handlowa leku	Odstawienie przed planowym zabiegiem wszczepienia portu naczyniowego lub dializacyjnego cewnika permanentnego	
BEZPOŚREDNIE INHIBITORY CZYNNIKA XA			
fondaparynuks	Arixtra	>48 godzin	
rywaroksaban	Xarelto		
apiksaban	Eliquis		
BEZPOŚREDNIE INHIBITORY TROMBINY			
dabigatran	Pradaxa	>4 dni	
clostazol	Cilostazol LEK-AM Cilostop Cilozek Decilosal Noclaud Stepcil		
INHIBITOR RECEPTORA ADP			
tikolpidyna	Aclotin Apo-Clodin Iclopid Ifapidin	>10 dni	
klopidogrel	Agregex Areplex Duoplavin Carder Clopidix Clopidogrel Apotex Clopidogrel Genoptim Clopidogrel GSK	Clopidogrel Ranbaxy Clopidogrel Teva Clopidogrelum 123ratio Grepid Pegorel Plavix Plavocorin Trombex Vixam Clopidogrel Krka Zyllt	>7 dni
prasugrel	Efient	>7 dni	
ticagrelor	Brilique		
ANTAGONIŚCI WITAMINY K			
acenokumarol	Acenokumarol Sintrom	>5 dni	
warfaryna	Warfin	>7 dni	
Terapia pomostowa			
<p>⇒dalteparyna (Fragmin) 5000 IU s.c. co 24h ⇒enoksaparyna (Clexane, Neoparin) 40mg (<80kg) / 60mg (>80kg) s.c. co 24 h ⇒nadroparyna (Fraxiparine) 2850 IU s.c. co 24 h</p> <p style="text-align: center;">OSTATNIĄ DAWKĘ TERAPII POMOSTOWA NALEŻY PRZYJAĆ W DZIEŃ POPRZEDAJĄCY IMPLANTACJĘ PORTU WIECZOREM</p>			